Flächenbestimmungen

(Fläche und Integral)

Beispiel: Unter dem Funktionsgraphen von

$$f(x) = -\frac{x^2 - 14 \cdot x + 17}{4} \text{ soll im Intervall } [2; 6] \text{ das}$$

Flächenstück berechnet werden, das zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse liegt!

Vorbereitungen: Aus dem Ergebnis des „näherungsweise“ Integrierens erhalten wir:

$$F(x) - F(x_0) \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_0 + i \cdot \Delta x) \cdot \Delta x$$

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f(x) dx$$

$$\text{also: } \sum_{i=0}^{n-1} f(x_0 + i \cdot \Delta x) \cdot \Delta x \approx \int_{x_0}^x f(x) dx$$

Hinweis: F(x) ist Stammfunktion von f(x)

Mit anderen Worten: Summen der obigen Gestalt lassen sich (näherungsweise) mit Hilfe des bestimmten Integrals berechnen.

Wir berechnen die im Beispiel bezeichnete Fläche mit Hilfe von gleich breiten Rechtecksflächen, die zur Gänze unter dem Funktionsgraphen liegen¹ (der linke obere Eckpunkt liegt auf dem Funktionsgraphen):

Die Abbildung zeigt 10 Rechteckstreifen. Mit dem Voyage berechnen wir die Summe der Flächen:

¹ Man bezeichnet diese Näherung als „Untersumme“

$$\blacksquare \frac{-(x^2 - 14 \cdot x + 17)}{4} \rightarrow f(x) \quad \text{Done}$$

$$\blacksquare \sum_{i=0}^9 \left(\frac{f(2 + 4/10 \cdot i) \cdot 4}{10} \right) \quad 20.44$$

Der Wert 20,44 wird etwas kleiner sein, als der gesuchte Flächeninhalt! **Warum?** Für die Verbesserung des Näherungswertes teilen wir das Intervall [2; 6] in 100 Streifen und rechnen wieder:

$$\blacksquare \sum_{i=0}^{99} \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{100} \cdot i\right) \cdot 4}{100} \right) \quad 21.55$$

Bei 1000 Streifen:

$$\blacksquare \sum_{i=0}^{999} \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{1000} \cdot i\right) \cdot 4}{1000} \right) \quad 21.65$$

Wir führen schließlich eine Grenzwertberechnung für „unendlich“ viele Rechteckstreifen durch ...

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{n} \cdot i\right) \cdot 4}{n} \right) \quad 21.67$$

... und vergleichen mit dem bestimmten Integral:

$$\blacksquare \int_2^6 f(x) dx \quad 21.67$$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung:

Sei f im Intervall [a; b] stetig und F irgendeine Stammfunktion von f, dann gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Wir rechnen das obige Beispiel noch einmal näherungsweise mit einer „Obersumme“ ...

$$\blacksquare \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{f(2 + 4/10 \cdot i) \cdot 4}{10} \right) \quad 22.84$$

$$\blacksquare \sum_{i=1}^{100} \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{100} \cdot i\right) \cdot 4}{100} \right) \quad 21.79$$

$$\blacksquare \sum_{i=1}^{1000} \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{1000} \cdot i\right) \cdot 4}{1000} \right) \quad 21.68$$

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{f\left(2 + \frac{4}{n} \cdot i\right) \cdot 4}{n} \right) \quad 21.67$$

... und erhalten das gleiche Ergebnis!